

Contractuur van Dupuytren: een of meer vingers trekken krom

***Samenvatting uit patiëntbrief Nederlands Huisartsen
Genootschap 2010.***

Dit is een publicatie van
Hand & Pols Revalidatie Nederland




WWW.HPRN.INFO



Wat zijn de verschijnselen?

Dupuytren wordt gekenmerkt door vaste EN soms pijnlijke knobbels in de handpalm en vingers, met name in pink en ringvinger, die zich kunnen ontwikkelen tot strengen. Op langere termijn kan dit leiden tot kromstand van de vingers.



Wat is het?

De aandoening komt vooral voor bij mannen rond de vijftig jaar in Noordwest-Europa en is zeldzaam onder Noord-Afrikanen.

Een contractuur van Dupuytren heeft deels een genetische oorsprong. Ongeveer een kwart van de patiënten heeft een familielid met soortgelijke klachten. De aandoening leidt niet altijd tot kromme vingers. De prognose is slechter indien de klachten ontstaan op jonge leeftijd, de aandoening tevens in de familie voorkomt en bij suikerziekte.

Behandeling

- in eerste instantie wordt afgewacht als de vinger(s) nog niet krom staan
- de huisarts verwijst voor een operatieve behandeling als de vingers krom staan. Hierbij worden de strengen verwijderd of alleen doorgenoemen.



Klink op de afbeelding hiernaast om het YouTube filmpje van een operatie te openen.

Heeft u dit document geprint?

Ga dan in uw browser naar:

https://www.youtube.com/watch?v=yjYRlo_Zupw